



Universidad Nacional de Ucayali

Facultad de Ciencias de la Salud
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA



*Conocimiento sobre Leishmaniasis Cutánea y
medidas sanitarias adoptadas por los pacientes
que acuden al Programa de Malaria y otras
Enfermedades Metaxénicas del Hospital
Regional de Pucallpa - 1999*

TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE
Licenciadas en Enfermería

Tatiana Valera Vásquez
Carmencita Tipto Soto

Pucallpa — Perú

2000


ESTA TESIS FUE APROBADA POR EL JURADO DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS DE LA SALUD



Lic. Enf. Rosa Delgado Soria
Presidenta



Blgo. Jaime Pastor Segura
Miembro



Lic. Enf. Teresa Elespuro Najar
Miembro



Lic. Enf. Yolanda Santos Villegas
Miembro



Lic. Enf. Eldalaine Torres Vargas
Miembro



Bach. Enf. Tatiana Vasquez Valera
Graduando



Bach. Enf. Carmencita Tipto Soto
Graduando



Odont. Victor Hernández Mendoza

A mis queridos padres Jaime y Olga, a mi esposo Nestor y a mis hijos que me alentaron en todo momento al desarrollo de mi profesión.

TATIANA

A mis padres Jaime y Margarita y
a mi esposo é hijo con mucho
amor que de una ú otra forma
hicieron posible la culminación
de mi carrera profesional.

CARMENCITA

AGRADECIMIENTO

Al Director del Hospital Regional de Pucallpa, por las facilidades para la ejecución de este trabajo de investigación.

A todos los pacientes que fueron sujeto de nuestra investigación por su apoyo y colaboración.

Al Odont. Víctor Hernández Mendoza por el asesoramiento de nuestra tesis.

A los docentes miembros del jurado calificador por sus orientaciones y conocimientos transmitidos.

A todas las personas que de una ú otra manera nos ayudaron y apoyaron desinteresadamente en la culminación de nuestro trabajo de investigación

INDICE

	Pag.
Dedicatoria.....	iii
Agradecimiento.....	v
Indice de cuadros.....	viii
Indice de gráficos.....	xi
Resumen.....	xii
Introducción.....	xiv

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1	Formulación del Problema	16
1.2	Antecedentes del Problema	17
1.3	Objetivos de la Investigación	25
1.4	Justificación	25
1.5	Hipótesis y Variables	26

CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1	Revisión Bibliográfica	29
2.1.1	Generalidades sobre conocimiento	29
2.1.2	Leishmaniasis, Características y Agente causal	34
2.1.3	Las Leishmaniasis en le Perú	41
2.2	Definición de Términos Básicos.....	43

CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1	Método de Investigación	46
3.2	Población y Muestra	47
3.3	Técnicas é Instrumentos de Recolección de Datos	48
3.4	Procedimiento de Recolección de Datos	49
3.5	Tratamiento de Datos	49

CAPITULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES.....	84
RECOMENDACIONES.....	86
CITAS BIBLIOGRAFICAS	88
BIBLIOGRAFÍA	91
ANEXOS	97

RESUMEN

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la relación entre el nivel de conocimiento sobre la Leishmaniasis Cutánea y las medidas sanitarias adoptadas por pacientes que acuden al programa de malaria y otras enfermedades metaxénicas del hospital regional de Pucallpa, en el año 1999.

El tipo de estudio fue descriptivo correlacional y retrospectivo, teniendo como población muestral a 40 casos atendidos de enero a diciembre del 1999. La recolección de datos se realizó a través de la técnica de la entrevista y análisis documental, mediante un test de conocimiento y el cuestionario. El análisis de datos se hizo en base a la estadística descriptiva para la contratación de la hipótesis general se aplicó la prueba estadística no paramétrica de la χ^2 cuadrado, con un nivel de significancia de 0.05, obteniendo los siguientes resultados: 32 casos de Leishmaniasis cutánea corresponden al sexo masculino y soló 8 al sexo femenino siendo el promedio de edad en ambos sexos de 26 años; Predominando la ocupación dependiente y la procedencia de la zona del alto Ucayali (53%) En relación al nivel de conocimiento se observa que este fluctúa entre bueno y muy bueno con un 45% respectivamente, este conocimiento tiene relación con la fuente de información representada por el personal de salud en un 53%. Los recursos utilizados para el tratamiento de la leishmaniasis antes de acudir al programa en un 42.5% fueron las plantas medicinales, así mismo la mayoría de pacientes realizaron medidas sanitarias inadecuadas. Estos resultados nos permiten arribar a las siguientes conclusiones: La mayoría de pacientes estudiados tienen un conocimiento bueno sobre la leishmaniasis, esto se atribuye a la información recibida por parte del profesional de salud, pero el hecho de tener un conocimiento bueno, no garantiza el acceso temprano al establecimiento de salud, ya que el tiempo promedio transcurrido entre la aparición de los signos y la consulta fue de cuatro meses. Los recursos utilizados por los pacientes antes de acudir al programa fueron en orden de importancia, plantas medicinales, ácido de batería, aceite quemado, cigarro y ampicilina, un porcentaje significativo no usó ningún recurso. Las plantas mas utilizadas fueron el piñón, la copaiba. El hecho de no haber utilizado ningún recurso terapéutico fue considerado para el análisis como medida sanitaria inadecuada. Al relacionar esta variable con el nivel de conocimiento sobre la enfermedad se concluye que efectivamente existe relación entre estas variables, pero la relación es negativa, lo que

significa que el nivel de conocimiento no es el único factor que puede influir en la adopción de medidas sanitarias. Al estudiar el grado de satisfacción de los pacientes que brindan el programa, la mayoría refiere que el grado de satisfacción es alto evidenciado, por el trato amable, sobre todo por el poco tiempo para ser atendido.