

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
Facultad de Ciencias de la Salud
Escuela Académica Profesional de Enfermería



Factores de riesgo materno y su influencia en el peso del recién nacido en el Hospital Regional de Pucallpa
Pucallpa - 1998



Tesis para optar el Título de
Licenciada en Enfermería

Lizeth Julyana Galindo Jaime

14156

Pucallpa - Perú
1998

ESTA TESIS FUE APROBADA POR EL JURADO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD


Enf. Isabel Esteban Robladillo
Presidenta


Enf. Rolinda Falcon RivaAgüero
Miembro


Lic. Enf. Aunstela Chávez Vidalón
Miembro


Obst. Milagros Mayra Alvarado
Asesora


Lizeth Galindo Jaime
Graduando

A mis queridos padres que con su amor y estímulo constante incentivaron mi realización plena.

En especial a mi madre Juana por el esfuerzo indomable en la trayectoria de mi formación profesional.

Con cariño y gratitud a mis hermanos Christian y Dolly por su apoyo y comprensión.

Libeth

AGRADECIMIENTO

A mi asesora Obst. Milagros Mayma Alvarado, por el apoyo incondicional durante el desarrollo del estudio.

A los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud, que con sus enseñanzas y experiencia han contribuido en mi formación profesional, en especial a los miembros del jurado calificador por sus comprensión constante.

Al personal que labora en el servicio de admisión y archivo del Hospital de Salud de Pucallpa, por su desinteresada colaboración en el recojo de la información.

A los directivos del Hospital de Salud de Pucallpa quienes facilitaron el proceso de recolección de datos.

INDICE

N°	CONTENIDO	PAG.
	Dedicatoria	ii
	Agradecimiento	iv
	Índice de cuadros	viii
	Índice de gráficos	x
	Resumen	xii
INTRODUCCION		
1	Formulación del problema	01
2	Antecedentes	01
3	Objetivos de la investigación	03
4	Justificación e importancia	04
5	Hipótesis, variables y operacionalización de variables	05
CAPITULO I		
MARCO TEORICO Y DEFINICION DE TERMINOS		
BASICOS		
1.1	MARCO TEORICO	08
	1.1.1. Factores de riesgo materno	08
	a. Antecedentes obstétricos	08
	a.1. Edad.	08
	a.2. Aborto	09
	a.3. Paridad	11

b. Enfermedades hipertensivas.	14	
c. Infección del tracto urinario	17	
d. Factores psicosociales	19	
1.1.2. Recién nacido	21	
a. Recién nacido normal	21	
a.1. Características anatómicas y fisiológicas del recién nacido.	22	
b. Atención del recién nacido prematuro	32	
b.1. Reconocimiento de un niño prematuro.	32	
b.2. Cuidado del niño prematuro	33	
b.3. Control del niño prematuro	37	
b.4. Complicaciones del niño prematuro	37	
1.2	DEFINICION DE TERMINOS BASICOS	39
	CAPITULO II	
	METODOLOGIA	
2.1	Método	40
2.2	Población y muestra	40
2.3	Técnica e instrumento de recolección de datos	41
2.4	Procedimiento de recolección de datos	41
2.5	Tratamiento de datos	42
	CAPITULO III	
	RESULTADOS Y DISCUSION	43
	CAPITULO IV	
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	

Conclusiones	94
Recomendaciones	95
Bibliografía	96
Anexos	98

RESUMEN

El propósito del estudio es analizar la influencia de los factores de riesgo materno en el peso del recién nacido en el Hospital Regional de Pucallpa, sugerir acciones tendientes a evitar la morbimortalidad infantil.

La investigación pertenece al nivel descriptivo no experimental de corte correlacional, exposfacto. La muestra estuvo constituida por 600 madres que acudieron para atenderse el parto en el Hospital Regional de Pucallpa durante el año de 1997. Como técnica se utilizó la observación no participante y como instrumento una ficha de registro.

La información fue recolectada en el turno de las mañanas durante el mes de febrero de 1998.

Los datos fueron procesados mediante la informática, el análisis se basó en la estadística descriptiva, en la prueba de hipótesis se aplicó la estadística no paramétrica, chi cuadrado con nivel de significancia de 0,05.

Las conclusiones son:

Los factores de riesgo en madres que acudieron al Hospital Regional de Pucallpa son: Edad, adultas maduras; paridad, 4 - 6 hijos; falta de control prenatal.

42 por ciento de recién nacidos muestran peso normal; 32 por ciento bajo peso y 26 por ciento sobre peso.

Las infecciones del tracto urinario que adolecieron las madres durante la gestación influyeron en el bajo peso del recién nacido.