


UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI



FACULTAD DE MEDICINA HUMANA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

TESIS

“FACTORES DEL ABANDONO AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD (TARGA) EN LOS PACIENTES DEL CENTRO DE REFERENCIA DE ITS/VIH – SIDA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA AGOSTO 2014 AGOSTO 2015”

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

PRESENTADO POR LOS BACHILLERES:

EDIE VILLACORTA CORDOVA

JOSE ALBERTO SALAZAR VASQUEZ

PUCALLPA – PERÚ

2017

Resumen

Introducción: La infección por el virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/sida) es una de esas enfermedades crónicas que ha tenido un comportamiento epidémico y constituye actualmente uno de los problemas de salud pública más graves a nivel mundial, debido a su propagación constante y continua. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/sida) es una de esas enfermedades crónicas que ha tenido un comportamiento epidémico y constituye actualmente uno de los problemas de salud pública más graves a nivel mundial, debido a su propagación constante y continua. **Objetivo:** Determinar los Factores del abandono al Tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) en los pacientes del centro de referencia de ITS/VIH – SIDA del Hospital Regional de Pucallpa Agosto 2014 Agosto 2015. **Materiales y métodos.** Es un estudio descriptivo correlacional, prospectivo, longitudinal. Se usó el test de adherencia al tratamiento CEAT-VIH y el test de apoyo social percibido DUKE – UNC y ficha de recolección de datos; para el tratamiento de los datos la medida de tendencia central; %5 para la significancia estadística. La prueba de normalidad kolmogorov smirnov con los estadísticos Spearman, Fisher, Pearson. Fueron significativos Adherencia y apoyo social percibido ($p < 0,05$); tipo de abandono y efectos adversos ($p < 0,05$); y no significativo, apoyo social percibido y orientación sexual ($p > 0,05$); adherencia y CD4 ($p > 0,05$); efectos adversos y esquema de tratamiento ($p > 0,05$); edad y adherencia al tratamiento ($p > 0,05$); ocupación e ingreso mensual; ocupación y motivo de abandono ($p > 0,05$) **Conclusión:** el abandono se genera por motivos de no adherencia en relación al apoyo social que perciben los individuos. También lo hacen por que presentan efectos adversos, debido al tratamiento.

Palabras clave: Abandono, VIH, TARGA.

Abstract

Introduction: Human immunodeficiency virus and acquired immunodeficiency syndrome (HIV / AIDS) infection is one of those chronic diseases that has had an epidemic behavior and is currently one of the most serious public health problems worldwide. To its constant and continuous propagation. Human immunodeficiency virus and acquired immunodeficiency syndrome (HIV / AIDS) infection is one of those chronic diseases that has had epidemic behavior and is currently one of the most serious public health problems worldwide due to its Constant and continuous propagation. **Objective:** To determine the factors of the abandonment of highly active antiretroviral therapy (HAART) in the patients of the STI / HIV - AIDS referral center of the Regional Hospital of Pucallpa August 2014 August 2015. **Materials and methods.** It is a descriptive correlational, prospective, longitudinal study. The CEAT-HIV treatment adherence test and the DUKE-UNC perceived social support test and data collection form were used; For the treatment of the data we used measures of central tendency; % 5 for statistical significance. We used the normality test kolmogorov smirnov and also the statisticians Spearman, Fisher, Pearson. They were significant Adherence and perceived social support ($p < 0.05$); Type of abandonment and adverse effects ($p < 0.05$); And non-significant, perceived social support and sexual orientation ($p > 0.05$); Adhesion and CD4 ($p > 0.05$); Adverse effects and treatment schedule ($p > 0.05$); Age and adherence to treatment ($p > 0.05$); Occupation and monthly income; Occupation and motive of abandonment ($p > 0.05$) **Conclusion:** abandonment is generated by reasons of adherence in relation to social support that individuals perceive. It also does so because they have adverse effects due to treatment.

Key words: Abandonment, HIV, HAART.