

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



**FACTORES MATERNOS Y FETALES RELACIONADOS CON LA MUERTE
DEL NEONATO PREMATURO EN EL HOSPITAL AMAZÓNICO DE
YARINACOCHA EN EL PERIODO 2011-2014**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

AUTORAS:

BACH. ENF. SAIN ISAMAR GONZALES SALDAÑA

BACH. ENF. ROCIO GONZALES VALERA

ASESORA:

LIC.ENF. YNÉS DEL CARMEN TAVERA ARÉVALO

PUCALLPA – PERÚ

2017

RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la relación entre los factores maternos y fetales y la muerte del neonato prematuro en el Hospital Amazónico de Yarinacocha (HAY), en el período del 2011 al 2014. Se realizó una investigación no experimental, tipo descriptiva correlacional y retrospectiva. La muestra estuvo conformada por 100 casos de muerte de neonatos prematuros del HAY. La técnica de recolección de datos fue el análisis documental y el instrumento una ficha de datos. Resultados, la muerte del neonato prematuro precoz alcanzó el 32% y la tardía el 68% y entre los factores podemos mencionar: Factores sociodemográficos; etapa de vida el 38% fue adulta joven ($p= 0,166$), el 74% tiene procedencia rural ($p= 0,257$), el 71% tiene secundaria ($p= 0,163$), el 83% es conviviente ($p= 0,708$) y el 87% es ama de casa ($p= 0,468$). En relación a los factores obstétricos maternos; según el número de gestaciones el 44% fue primigestas ($p= 0,468$), según el parto el 53% fueron multiparas ($p= 0,169$), y en los controles prenatales el 62% fue incompleto ($p= 0,157$). En el factor patológico; la infección urinaria presentó mayor prevalencia con el 27% ($p= 0,287$). Finalmente en los factores fetales; la mortalidad neonatal se produjo en un 55% en el sexo masculino ($p= 0,863$), el 77% presentó un peso mayor de un 1kg. ($p= 0,179$), en la talla al nacer el 70% tenía entre 36 – 49 cm. ($p= 0,513$) y el Apgar a los 5' fue 5-9 puntos ($p=0,513$).

Se concluye, que los factores maternos que influyen con la muerte del neonato prematuro son: multiparas, control prenatal deficiente e infecciones urinarias; del mismo modo el factor fetal que más influye corresponde: al apgar a los 5' (depresión neonatal).

Palabras clave: Factores sociodemográficos, neonato, mortalidad, prematuro, fetal.

ABSTRACT

The present study aimed to determine the relationship between maternal and fetal factors and the death of the premature neonate at the Yarinacocha Amazon Hospital (HAY), from 2011 to 2014. A non-experimental, correlational descriptive and Retrospective The sample consisted of 100 cases of death of HAY preterm infants. The technique of data collection was the documentary analysis and the instrument a datasheet. Results: early preterm neonatal death was 32% and late death was 68%, and among the factors we can mention: Sociodemographic factors; 38% were young adults ($p = 0,166$), 74% had rural origin ($p = 0.257$), 71% had secondary education ($p = 0.163$), 83% had cohabitation ($p = 0.708$) and 87% are housewives ($p = 0.468$). Regarding maternal obstetric factors; According to the number of gestations, 44% were primigravidae ($p = 0.468$); according to the delivery, 53% were multiparous ($p = 0.169$), and in the prenatal controls, 62% were incomplete ($p = 0.157$). In the pathological factor; Urinary infection had a higher prevalence with 27% ($p = 0.287$). Finally in the fetal factors; Neonatal mortality occurred in 55% of males ($p = 0.883$), 77% had a weight greater than 1kg. ($P = 0.179$), at birth. at birth 70% were between 36-49 cm. ($P = 0.513$) and the Apgar at 5'was 5-9 points ($p = 0.513$).

It is concluded that the maternal factors that influence the death of the premature neonate are mutiparas, poor prenatal control and urinary infections; In the same way the fetal factor that most influences corresponds: to the apgar to the 5` (neonatal depression).

Key words: Sociodemographic factors, neonate, mortality, premature, fetal.